



Clube da Mama 07/11/2017

Caso Clínico

Dra Maria Cecília Monteiro Dela Vega

Oncologista Clínica- CEBROM e Hospital Araujo Jorge





Identificação

- RAS, 61 anos, Sexo feminino, branca, procedente de Senador Canedo-GO
- Consulta com mastologista 31/07/17:
- QP : Seguimento nódulos mamários.
- HMA: Relatava nódulos mamários, com “biopsia negativa” - SIC não trouxe exame). Há alguns dias dor retroesternal e mamaria esquerda



- Doenças pregressas: HAS, Depressão por parto, transtorno de ansiedade/pânico
- Medicamentos em uso: Fluoxetina, Clonazepam, Atenolol, Clortalidona
- Relato de acatia com plasil , bromoprida, drammin.



- Antecedentes Familiares: Nega neoplasia de mama na família, irmã falecida ca colo de útero e irmão falecido ca pulmão
- Hábitos de vida: Nega tabagismo, Etilista Social, realiza Atividade física regularmente



- EXAME FÍSICO: BEG, ECOG 0, eutrofica, Peso 58 Kg Kg alt 1,60m

Mama esquerda retraída , área endurecida palpável aderida de 8 cm

Axila e fossa supraclavicular livres

Mama direita sem alterações

Tórax/dorso- cicatriz herpes zoster

Abdome : ndn





- Solicitado RNM mamas mas paciente não realizou
- Solicitado USG mamas



- USG 22/08/2017-
- Formação ovalar hipoecogênica medindo 0,8 x 0,3 x 0,5 cm (cisto com conteúdo denso? Linfonodo intramamário?)
- Formação ovalar hipoecogênica, heterogênea de limites parcialmente definidos e contornos microlobulados com marcada atenuação acústica medindo 2,5 x 2,3 x 2,0 cm (“status” pós cirurgico?)
- Formação ovalar hipoecogênica medindo 1,2 x 1,1 x 1,2 cm (fibroadenoma? nódulo sólido de outra natureza?)
- Formação ovalar hipoecogênica as 12 h periareolar medindo 2,1 x 1,3 x 2,0 cm
- Linfonodo aumentado de volume axilar esquerdo 1,6 x 1,4 x 1,7 cm



- Core Biopsy 22/08/17 - Carcinoma mamário Infiltrante, padrão de infiltração lobular grau 1
- Anatomopatológico: RE+80 a 90% RP +30 a 40 % HER 2 negativo , KI 67 5 a 10 %



Exames Estadiamento

- Cintilografia óssea: 11/09/17 Reação Osteogênica no esterno compatível com processo neoplásico secundário

ARREDURA 5/9/2017

CINTILOGRAFIA OSSEA



ANTERIOR 2181K Duration:838sec 256x1024
Pix:2,4mm 99m Technetium

POSTERIOR 2072K Duration:838sec 256x1024
Pix:2,4mm 99m Technetium



- Tc's T/A/P 08/09/17:

Densificação fossa supraclavicular/região infrapeitoral esquerda com linfonomegalia de permeio

Ausência de adenomegalia mediastinal

Tendinopatia cálcica- tendões do manguito rotator

Lesão osteoblástica no corpo do esterno



Observações

- Limitações logísticas/convênio
- Familiares solicitam manter sigilo sobre metástase óssea devido ao transtorno de ansiedade



Conduta : ???

- Hormonioterapia paliativa?
- Cirurgia mama > RT externo > HT?
- Quimioterapia > Cirurgia mama > Radioterapia externo > Hormonioterapia ?
- Hormonioterapia > Cirurgia mama > Radioterapia externo > hormonioterapia ?
- Radioterapia + Hormonioterapia??
- Outras opções?
- Cirurgia ressecção metástase óssea?



Iniciou quimioterapia: Paclitaxel semanal S1 em 22/09/17.

Realizou até o momento 7 semanas.

Benefício clínico- melhora da dor retroesternal e mamária, diminuição “consistência”

Boa tolerância

Porém não houve efetivamente redução tumoral

